

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



ADSORBANT GASTROINTESTINAL ENTEROSGEL® PENTRU UTILIZARE ÎN CAZ DE DIAREE ACUTĂ SAU CRONICĂ ÎN CAZ DE IBS

ENTEROSGEL®

- Tub 225 g
- Tub 90 g
- Plic 15 g (10 plicuri într-un pachet)

MOD DE UTILIZARE PROPUȘ

ENTEROSGEL® este o suspensie perorală indicată pentru tratamentul simptomatic al diareei acute precum și al diareei cronice asociate sindromului colonului iritabil (IBS).

CE ESTE ENTEROSGEL® ȘI PENTRU CE SE FOLOSEȘTE

ENTEROSGEL® este un adsorbant intestinal ce se administrează pe cale orală (entero-sorbent). Este bazat pe un mineral organic ce are capacitatea de adsorbție a substanțelor toxice și nocive din intestin (de ex. endotoxine, enterotoxine), pe care le leagă fizic pe suprafața sa și le elimină din organism, contribuind la reducerea frecvenței defecației și duratei diareei. ENTEROSGEL® se elimină din corp prin scaun și astfel îndepărtează toxinele adsorbite precum și substanțe nocive ceea ce poate avea un efect benefic în cazul tratamentului stărilor de diaree acută și cronică în caz de IBS.

Compoziție:

polimetilsiloxan polihidrat (hidrogel al acidului metilsilicic) – 70 %, apă purificată – 30 %.

ENTEROSGEL® nu conține conservanți, coloranți, gluten, grăsimi, zahăr, lactoză, agenți apesitanți, ingrediente de origine vegetală și animală.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- ENTEROSGEL® se administrează cu 2 ore înainte sau după masă sau după administrarea perorală a medicamentelor.
- Adminiștrați ENTEROSGEL timp de

3–5 zile în caz de o diaree acută și până la 21 de zile în caz de diaree cronică.

- Diluăți doza în apă la temperatura camerei înainte de administrare.
- Utilizați pliculețul imediat după deschidere. Diluați conținutul plicului în apă.

DURATA DE ADMINISTRARE ȘI DURARE

Copii în vârstă de:

- **1–3 ani** se recomandă a se consulta medicul înainte de a administra ENTEROSGEL®.
- **1–6 ani:** 5 g (aproximativ 1 linguriță sau 1/3 din plic) diluat în 50–100 ml de apă de 3 ori pe zi.
- **7–14 ani:** 10 g (aproximativ 2 lingurițe sau 2/3 din plic) diluat în 50–100 ml de apă de 3 ori pe zi.
- **Copii în vârstă de 15 ani și adulții:** 15 g până la 22,5 g (aproximativ 1 lingură sau 1 – 1,5 plic) diluat în 200 ml de apă de 3 ori pe zi.

La începutul tratamentului (în prima zi) puteți să dublați prima doză și apoi puteți să continuați cu câte o doză după fiecare scaun, și anume de 3 până la 6 ori pe zi. În prima zi adminiștrați cel mult 8 doze.

- Întrerupeți administrarea ENTEROSGEL dacă nu aveți scaun timp de 1-2 zile. Măriți aportul de apă și continuați după ce aveți scaun.
- În timpul tratamentului diareei cronice puteți adapta doza în așa fel încât să corespundă intensității și frecvenței scaunului. Este posibil să se administreze chiar doza dublă de 3 ori pe zi în cazul în care scaunul este subțire, sau să se reducă la o singură doză o dată pe zi în cazul în care scaunul este normal. Se pot administra maxim 6 doze pe zi.

CONTRAINDICAȚII

A nu se administra ENTEROSGEL®:

- în cazul în care adminiștrați concomitent medicamente pe cale orală cu eliberare modificată (controlată),
- în cazul în care suferiți de aționie

intestinală (constipație severă datorată obstrucției intestinale) sau de ocuzie intestinală

- sau în cazul intoleranței la adminiștrarea preparatului în trecut.

EFECTE ADVERSE POSIBILE

Constipație, greață.

GRAVIDITATE ȘI ALĂPTARE

ENTEROSGEL® se poate administra în timpul sarcinii și alăptării. Se recomandă consultarea medicului dumneavoastră în cazul în care în timpul sarcinii sau alăptării nu vă simțiți bine.

MĂSURI PREVENTIVE

ENTEROSGEL® poate influența absorbirea unor medicamente care se administrează pe cale orală – adminiștrați ENTEROSGEL® cu 2 ore înainte sau după ce ați administrat medicamentul pe cale orală. În cazul în care adminiștrați anumite medicamente atunci consultați administrarea ENTEROSGEL-ului cu medicul dumneavoastră de familie sau farmacistul.

- ENTEROSGEL® ar trebui să fie administrat pe cale orală între mese.
- În cazul diareei de lungă durată, înainte de a lua ENTEROSGEL®, este necesar să se consulte un medic pentru a stabili diagnosticul bolii de bază.
- La copii, tratamentul diareei trebuie suplimentat prin adminiștrarea în timp util a unui lichid suficient pentru a evita deshidratarea.
- La adulți, se recomandă ca în timpul adminiștrării ENTEROSGEL® să fie asigurată o cantitate suficientă de lichide pentru a asigura rehidratarea adecvată.
- Dacă simptomele diareice persistă mai mult de 2 zile, atunci este necesar să consultați un medic.
- În cazul în care aveți febră, sânge în scaun, semne de deshidratare, șase sau mai multe scaune în ultimele 24 de ore, în același timp diaree și vărsături, dureri de stomac puternice sau permanente

atunci cereți asistență medicală cât mai curând posibil, mai ales atunci când este vorba de copii.

- Pentru adminiștrarea ENTEROSGEL-ului în primul trimestru de sarcină nu există date clinice de nici un fel. Înainte de adminiștrarea ENTEROSGEL-ului vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră.
 - A nu se utiliza după data de expirare.
 - A nu se utiliza dacă ambalajul este rupt.
 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 - A nu se depăși doza recomandată.
 - Nu depășiți durata tratamentului recomandată și nu adminiștrați preparatul împreună cu mâncare pentru a evita o posibilă deficiență de vitamine și de nutrimente.
 - Vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră dacă la ora actuală adminiștrați și alte absorbante intestinale, de exemplu preparate care conțin cărbune activat, argilă sau caolină. Medicul dumneavoastră vă va sfătui ce n-ar trebui să adminiștrați împreună cu preparatul ENTEROSGEL®.
 - ENTEROSGEL® nu este indicat pentru cazuri de intoxicație chimică sau intoxicații cu medicamente sau pentru supradozajul medicamentelor.
- #### Plicuri
- După deschidere, fiecare plic poate fi folosit numai o singură dată.
 - Plicurile sunt de unică folosință și trebuie să fie deschise imediat înainte de utilizare.
 - A nu se reutiliza plicurile parțial folosite pentru a preveni contaminarea microbiană.
- #### Tuburi
- Înainte de deschidere și înainte de fiecare utilizare agitați bine tubul.
 - La stoarcerea ENTEROSGEL-ului din tub sau din plic poate apărea o mică cantitate de lichid.
 - După deschidere și după fiecare utilizare închideți bine capacul tubului în așa fel încât să nu se producă uscarea și contaminarea microbiană.
 - A se consuma tubul în cel mult 30 de zile după deschidere.

CUM SE PĂSTREAZĂ PREPARATUL:

- A nu se consuma Enterosgel după expirarea duratei de utilizare indicată pe ambalaj.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A se păstra ENTEROSGEL® la temperaturi de la 4°C până la 30°C.
- A nu se îngheța.
- A nu se expune la căldură excesivă și a se feri de razele directe ale soarelui.
- Data expirării indicată pe ambalaj se referă la produsul nedeschis, depozitat în mod corespunzător.

LICHIDARE

Eliminarea preparatului ENTEROSGEL® neutilizat nu este supusă măsurilor speciale. Preparatul poate fi aruncat în siguranță în deșeurile menajere. Ambalajul este reciclabil.

Ambalaj: Suspensie perorală în tub de 225 g, tub de 90 g, plic de 15 g (ambalaj câte 10 plicuri).

Valabilitate: 3 ani. A nu se administra după data de expirare indicată pe ambalaj.

Dacă aveți alte întrebări suplimentare cu privire la utilizarea preparatului ENTEROSGEL®, adresați-vă vă rog prin e-mail: office@enterosgel.ro.

Prezentele Instrucțiuni de utilizare le găsiți și în alte limbi www.enterosgel.eu.

ENTEROSGEL® ÎN TUB:



ENTEROSGEL® ÎN PLIC:



DOZARE:

Vârsta	Doză	Cât de des
Copii 3–6 ani	5 g (≈ 1 linguriță)	de 3 ori pe zi
	sau 1/3 din plic	
Copii 7–14 ani	10 g (≈ 2 lingurițe)	de 3 ori pe zi
	sau 2/3 din plic	
15+ și adulți	15 până la 22,5 g (≈ 1 lingură)	de 3 ori pe zi
	1 – 1,5 din plic	

Explicații privind simbolurile și pictogramele de pe ambalaj:



Producător:

BioLine Products

BioLine Products s.r.o.
Krakovská 1338/10
110 00 Praha 1, Česká republika
info@enterosgel.eu
www.enterosgel.eu

Distribuitor:
SC NANO BIO MEDICAL SRL
Intrarea Armașului, nr. 12, ap. 2,
sector 1,
București, România, 010484
Telefon: 021.210.52.40
office@enterosgel.ro
www.enterosgel.ro

ENTEROSGEL®

Dispozitiv
medical clasa IIa

CE 0123



Data versiunii actualizate
a prospectului: 16.07.2020

TUV/IFU/RO/TS/1